STRUCTURES ALGÈBRIQUES

Aucun document autorisé, calculatrice et téléphone interdits. Barème indicatif.

Toute réponse doit être justifiée.

Petites Questions (4 points + 1 de bonus si au moins deux bonnes réponses).

a) Décrire les idéaux de l'anneau euclidien $\mathbb{Z}[i]$ et démontrer que tout idéal non réduit à $\{0\}$ contient un nombre entier positif non nul.

b) Écrire la décomposition en cycles disjoints, puis calculer le signe et l'ordre de la permutation σ de S_8 :

$$\sigma = (5236)(134)(28)(347).$$

c) Dire si les polynômes f et g sont dans la même classe de l'anneau quotient $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 2)$:

$$f = 4x^5 - 9x^3 - 5, \quad g = -3x^4 + x^2 - 2x + 5$$

d) Donner le nombre d'éléments d'ordre 2 dans les groupes diédraux D_{128} et dans D_{129} .

Exercice 1 (3 points).

a) Soient G et H deux groupes et soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Soit $g \in G$ un élément d'ordre fini n . Démontrer que l'ordre de $\varphi(g)$ divise n .

b) Trouver tous les morphismes de groupes

$$\varphi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad \varphi : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

c) Soient p un nombre premier et $2 \leq n \in \mathbb{N}$. Donner une condition, nécessaire et suffisante sur p et n , pour qu'il existe un morphisme de groupes non trivial (i.e. non nul)

$$\varphi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Dans ce cas, combien en existent-ils ? Justifier la réponse.

Exercice 2 (4 points). Pour tout anneau R on note par R^* le groupe multiplicatif des inversibles. Soit

$$A = (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[x], \quad f = x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{2} \in A.$$

a) Lister les polynômes unitaires irréductibles de degré 2 de $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})[x]$.

b) Factoriser f comme produit d'irréductibles de A .

c) En utilisant le lemme chinois, écrire un isomorphisme d'anneaux explicite entre $A/(f)$ et un produit direct de deux anneaux, on les note A_1 et A_2 .

d) Calculer $|A_1^*|$, $|A_2^*|$. À quel groupe connu sont isomorphes A_1^* et A_2^* et pourquoi?

Exercice 3 (4 points).

- a) Donner les décompositions possibles en cycles disjoints d'un élément d'ordre 6 dans S_5 . En déduire le nombre d'éléments d'ordre 6 de S_5 .
- b) Combien de générateurs a un groupe cyclique de cardinal 6? En déduire le nombre de sous-groupes cycliques de cardinal 6 de S_5 .
- c) Rappeler un résultat du cours de classification (à isomorphisme près) des groupes de cardinal 6.
- d) Expliquer comment trouver au moins 10 sous-groupes de S_5 de cardinal 6 mais pas cycliques.

Exercice 4 (8 points). Dans cet exercice A est un sous anneau de $\mathbb{Q}$, A^* est le sous-ensemble des inversibles de A , et $\mathcal{P} = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ premier}\}$ est l'ensemble des nombres premiers positifs de $\mathbb{Z}$.

Si $S \subseteq \mathcal{P}$ on note par $\mathbb{Z}_S \subseteq \mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels tels que tous les facteurs premiers du dénominateur sont dans S . En particulier $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_S$. On a

$$\mathbb{Z}_S = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \text{ tel que } \forall p \in \mathcal{P}, p|n \Rightarrow p \in S \right\}.$$

Par exemple $\mathbb{Z}_{\mathcal{P}} = \mathbb{Q}$ et

$$\mathbb{Z}_{\{2,3\}} = \left\{ \frac{m}{2^r 3^s} \mid m \in \mathbb{Z}, r, s \in \mathbb{N} \right\}.$$

Le but de l'exercice est de démontrer que tous les sous-anneaux de $\mathbb{Q}$ sont de ce type et, puis, de démontrer qu'ils sont tous factoriels.

- a) Démontrer que $\mathbb{Z}_{\{2,3\}}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
- b) Pour tout $S \subseteq \mathcal{P}$ (donc même de cardinal infini), démontrer que $\mathbb{Z}_S$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
- c) Soit $S = A^* \cap \mathcal{P}$. Démontrer que $\mathbb{Z}_S \subset A$.
- d) Démontrer que si $\frac{m}{n} \in A$, avec $m \wedge n = 1$, alors $\frac{1}{n} \in A$.
- e) En déduire que $A = \mathbb{Z}_S$.
- f) Soit I un idéal de A . Démontrer que $I \cap \mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, puis démontrer que I est principal.
- g) Démontrer que tout sous-anneau de $\mathbb{Q}$ est factoriel.
- h) Soit D un anneau principal et soit $Q = \text{Frac}(D)$. Que peut on dire, en justifiant la réponse, sur les sous-anneaux de Q ?

CORRIGE

P.P. a) $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien, donc principal. Si I est un idéal de $\mathbb{Z}[i]$

différent de $\{0\}$ il existe $(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \setminus (0,0)$ t.q. $I = (a+ib)$

Puisque I est un idéal $\forall z \in \mathbb{Z}[i] \quad z(a+ib) \in I$ Si on prend $z = a-ib$

$$\text{on a } (a-ib)(a+ib) = a^2 + b^2 \in I \cap (\mathbb{N} \setminus \{0\})$$

b) $\sigma = (16 \ 5 \ 2 \ 8 \ 3) (47) \Rightarrow |\sigma| = 6 \cdot 2 = 6 ; \text{sgn } \sigma = (-1)^{6-1} (-1)^{2-1} = +1$

c) $f + (x^2-2) = g + (x^2-2) \Leftrightarrow x^2-2 \mid f-g$ ce qui est le cas car

$4x^5 + 3x^4 - 9x^3 - x^2 + 2x - 10$	$x^2 - 2$
$-4x^5 \quad + 8x^3$	$4x^3 + 3x^2 - x + 5$
<hr style="width: 100%;"/>	
$3x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 10$	
$-3x^4 \quad + 6x^2$	
<hr style="width: 100%;"/>	
$-x^3 + 5x^2 + 2x - 10$	
$+x^3 \quad - 2x$	
<hr style="width: 100%;"/>	
$5x^2 - 10$	
$-5x^2 \quad + 10$	
<hr style="width: 100%;"/>	
0	

d) $D_{128} = \{R^i, S_1, \dots, S_{128} \mid i=0, \dots, 127\}$
 $\forall j=1, \dots, 128$
 $|S_j| = 2$
 $|R| = 128$

 $2 \mid 128 \Rightarrow \exists 1$ élément
 d'ordre 2 dans
 $\langle R \rangle$

$D_{129} = \{R^i, S_1, \dots, S_{129} \mid i=0, \dots, 128\}$
 $|S_j| = 2, |R| = 129$
 $\forall j=1, \dots, 129$

 $2 \nmid 129$
 $\Rightarrow \nexists$ élément d'ordre 2 dans $\langle R \rangle$

donc 129 éléments d'ordre 2 dans D_{129}

Exercice 1 a) $g^n = 1 \Rightarrow \varphi(g^n) = \varphi(g)^n = 1 \Rightarrow |\varphi(g)| \mid m$

b) $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ est cyclique $\Rightarrow \varphi$ est déterminé par l'image d'un générateur.

$\bar{1}$ est un générateur et il a ordre 3 $\Rightarrow \varphi(\bar{1}) = \begin{cases} \bar{0} & \text{ou} \\ \text{élément d'ordre 3} & \text{à cause de a)} \end{cases}$

puisque $|\varphi(\bar{1})| \mid 4$ par la suite on a que le seul morphisme $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ est le trivial ($\bar{1} \mapsto \bar{0}$)

Par contre on a 3 morphismes $\varphi: \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

$\bar{1} \mapsto \begin{cases} \bar{0} & (\text{morphisme trivial}) \\ \bar{2} & (\text{élément d'ordre 3}) \\ \bar{4} & (\text{élément d'ordre 3}) \end{cases}$

c) Si $p \mid m$ il y a $p-1$ éléments d'ordre p dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et $p \nmid n$ aucun.
Donc le même argument que en b) nous donne que l'on doit avoir $p \mid m$ et dans ce cas il y a $p-1$ morphismes non triviaux.

Exercice 2

a) $x^2 + \bar{1}, x^2 + x + \bar{2}, x^2 + \bar{2}x + \bar{2}$

b) $x^4 + \bar{2}x^3 + \bar{2}x + \bar{2} = x^4 - \bar{1} + \bar{2}x(x^2 + \bar{1}) = (x^2 + \bar{1})(x^2 - \bar{1} + \bar{2}x) = (x^2 + \bar{1})(x^2 + \bar{2}x + \bar{2})$

c) $A/\langle f \rangle \cong \frac{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[x]}{(x^2 + \bar{1})} \times \frac{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}[x]}{(x^2 + \bar{2}x + \bar{2})} = A_1 \times A_2$ car $x^2 + \bar{1} \wedge x^2 + \bar{2}x + \bar{2} = \bar{1}$

$a + \langle f \rangle \mapsto (a + (x^2 + \bar{1}), a + (x^2 + \bar{2}x + \bar{2})) \quad \forall a \in A$

d) A_1, A_2 corps car $x^2 + \bar{1}$ et $x^2 + \bar{2}x + \bar{2}$ irréductibles. Donc A_1^* et A_2^* sont des gcs cycliques (car, théorème, le gp multiplicatif d'un corps fini est cyclique)

$|A_2^*| = |A_2| - 1 = 3 - 1 = 2 = |A_1^*| \Rightarrow A_1^* \cong A_2^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Exercice 3

a) $\sigma \in S_5$, $|\sigma| = 6 \Rightarrow \sigma = (abc)(de)$ avec $\{a, b, c, d, e\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Calculer ces éléments revient à compter les cycles de longueur 3 dans S_5

(car il existe une unique façon de compléter (abc) avec un 2-cycle disjoint)

$\Rightarrow$ on a $\binom{5}{3} \times 2! = 20$ éléments d'ordre 6 dans S_5

b) un gp cyclique de cardinal 6 a $\varphi(6) = \varphi(3)\varphi(2) = 2$ générateurs $\Rightarrow$

il y a $\frac{20}{2} = 10$ sous gpus cycliques de S_5 de cardinal 6

c) si G est un gp de cardinal 6 alors G est isomorphe soit à $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ soit à S_3

d) $\forall \{a, b\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$ le sous gp $H_{\{a, b\}} = \{\sigma \in S_5 \mid \sigma(a) = a, \sigma(b) = b\}$ est

isomorphe à S_3 via $H_{\{a, b\}} \xrightarrow{\cong} S_{\overline{\{a, b\}}} = S_3$ où $\overline{\{a, b\}} = \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{a, b\}$
 $\sigma \mapsto \sigma|_{\overline{\{a, b\}}}$

$\Rightarrow$ on a $\binom{5}{2} = 10$ sous gpus de S_5 isomorphes à S_3

Exercice 4

a) Il faut vérifier $1 \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$ et $q_1, q_2 \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle} \Rightarrow q_1 \cdot q_2 \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}, q_1 - q_2 \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$

Par def $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$ donc $1 \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$ en plus on a $q_1 = \frac{m}{2^r 3^s}, q_2 = \frac{n}{2^t 3^z}$ alors

$q_1 \cdot q_2 = \frac{mn}{2^{r+t} 3^{s+z}} \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$ et $q_1 - q_2 = \frac{m2^t 3^z - n2^r 3^s}{2^{r+t} 3^{s+z}} \in \mathbb{Z}_{\langle 2, 3 \rangle}$

g) Encore une fois $1 \in \mathbb{Z}_5$ car $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}_5$ en plus soit $\left\{ \begin{array}{l} q_1 = \frac{m}{n}, q_2 = \frac{r}{s} \\ q_1, q_2 \in \mathbb{Z}_5 \end{array} \right.$

alors $q_1 q_2 = \frac{mr}{ns}$ et $\forall p \in \mathcal{P} : p | ns \Rightarrow p | m$ ou $p | s$ Donc $p \in S$

$q_1 - q_2 = \frac{sm - rm}{ns}$ et $p | ns \Rightarrow p | m$ ou $p | s$ Donc $p \in S$

c) A sous anneau de $\mathbb{Q}$, $S = A^+ \cap \mathcal{P} \Rightarrow \forall p \in S$ on a $\frac{1}{p} \in A$

Soit $\frac{m}{n} \in \mathbb{Z}_5$ et soit $n = p_1^{d_1} \dots p_r^{d_r}$ la factorisation de n comme produit de premiers dans $\mathbb{Z}$

alors $p_i \in S$ donc $\frac{1}{p_i}, \left(\frac{1}{p_i}\right)^{d_i}, m \cdot \frac{1}{p_i^{d_i}} \in A$ ie $\frac{m}{n} \in A$

d) $mnm = 1 \Rightarrow \exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z}$ et $1 = \alpha m + \beta n$ alors jusque $m/n \in A, \mathbb{Z} \subseteq A, A$ sous anneau de $\mathbb{Q}$

$$\frac{1}{n} = \frac{\alpha m + \beta n}{n} = \alpha \frac{m}{n} + \beta \in A$$

e) Soit $m/n \in A$ $mnm = 1 \quad \forall p \in \mathcal{P}$ tq. $p | m$ on pose $m = n'p$

On a $A \ni \frac{1}{n} \Rightarrow n' \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{p} \in A \Rightarrow p \in S$ et donc $m/n \in \mathbb{Z}_5$

f) $0 \in I \cap \mathbb{Z}$ en plus $a, b \in I \cap \mathbb{Z} \Rightarrow a - b \in I \cap \mathbb{Z}$ car I idéal de A et $\mathbb{Z}$ sous anneau de A

si $z \in \mathbb{Z} \subseteq A$ et $x \in I \cap \mathbb{Z}$ alors $z \cdot x \in I$ car I idéal et $z \cdot x \in \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}$

anneau. Donc il $\exists m \in \mathbb{N}$ et $I \cap \mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. On veut d.g.

$I = mA$. On a $m \in I, I$ idéal $\Rightarrow mA \subseteq I$

Reciproca si $x \in I \quad x = \frac{r}{s} \Rightarrow r = sx \in I \cap \mathbb{Z} = n\mathbb{Z} \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Z}$ et $r = nz$

$\frac{r}{s} \in I \subseteq A \Rightarrow \frac{1}{s} \in A$ donc $x = \frac{mz}{s} = n z \cdot \frac{1}{s} \in mA$

g) Puisque A est principal on a que A est factoriel

h) Dans ce qui précède on a seulement utilisé que $\mathbb{Z}$ est principal et $\mathbb{Q} = \text{Frac}(\mathbb{Z})$

$\Rightarrow$ on peut dire que tous les sous anneaux de $\mathbb{Q}$ sont principaux (donc factoriels)

et qu'ils sont du type $D_S = \{ \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \mid mn=1 \text{ et } \forall p \in P \quad p \mid n \Rightarrow p \in S \}$

où $P = \{ \text{éléments premiers de } \mathbb{Z} \}$ et $S \subseteq P$.